



**Использование нейропсихологических  
методов и приемов в работе с детьми с  
особыми образовательными  
потребностями**

**Выполнила**

**Педагог-психолог ГБОУ СО «Верхнесалдинская школа»**

**Шувалова Ксения Викторовна**

Сенсорная интеграция, необходимая для движения, говорения и игры - это фундамент более сложной интеграции, сопровождающей чтение, письмо и адекватное поведение.



# Нарушение процесса обработки сенсорной информации

Нарушение сенсорной модуляции

Сенсорная повышенная чувствительность

Сенсорная пониженная чувствительность

Поиск сенсорных ощущений

Сенсорно-дискриминационные расстройства

Сенсорно моторные расстройства

Постуральные нарушения

Диспраксия

## Методы и приемы при нарушениях обработки вестибулярной системы:

во время урока давать поручения, которые требуют перемещения по классу (раздать тетради, собрать тетради, переложить учебники на другой стол, поднять что-то с пола, развинуть шурупы и т. д.);

если ребёнок постоянно проявляет двигательное беспокойство во время уроков, можно разрешить ему встать на некоторое время и потом сесть на место. Так же в пролвинутых школах существуют стоячие парты, физ.минутки

## «ГИМНАСТИКА МОЗГА» книга для УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ



ВСЁ



Дополнение к  
«Гимнастике мозга»:  
простые упражнения  
для активизации  
обоих полушарий

Пол Е. Деннисон  
Гейл Е. Деннисон



Перекрещивание  
(в положении сидя)

Вестибулярная  
активность  
при расстройстве  
сенсорной обработки







Кнопки баланса



Качалка



Активация  
руки



Энерджайзер



Сгибание стопы




Метод приема при нарушении обработки проприоцептивной системы: переносить стопки учебников (сжимать в руках) разные предметы для формирования правильного зрвота использовать специальные носочки физ.минутки

# Проприоцептивная активность при расстройстве сенсорной обработки



DIY Weighted  
Lap Pad





## БОЧКА ДЛЯ УДОБНОГО ЗАХВАТА

Пользующийся материалом надежно удерживает инструмент  
Не впитывает запахи, легко мыть

\*

длина трубочки 30 см, её можно разрезать ножницами и использовать с несколькими предметами



7мм

Похожие

## Мяч массажный для укрепления пальцев рук реабилитационный

Взрослым для разработки пальцев рук после инсульта и травмы.

Детям с диагнозом ДЦП для восстановительной гимнастики



5 см

5 см

# Эспандеры

## ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

3 ШТ. КОМПЛЕКТЕ

5 kg

4 kg

3 kg

ДЛЯ ГИТАРИСТОВ

Похожие >



Методы и приемы при  
планировании обработки  
тактильной системы:

тихий уголок для увеличения  
ребенок стоит в начале или в  
конце шеренги

ребенок сидит за партой  
рядом со стеной

влажные салфетки в  
рюкзаке

Массаж/самомассаж для  
тактильной стимуляции

физ.минутки релаксации



Позитивные точки



Часть 1



Часть 2

Сцепление

# Тактильная чувствительность с нарушением сенсорной обработки



Мячик массажный  
аппликатор Ляпко



Улучшает  
моторику рук,  
кровообращение



Снимает стресс  
Расслабляет

▶ 55 мм



ИГЛЫ С ШАГОМ  
4 мм



Похожие >



Метод и прием при нарушении обработки оральной системы:

Использовать игрушки и предметы для жевания

Помогать ребёнку использовать язык и губы

Разрешайте жевать резинку во время перерывов

## ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ПОДВЕСКА

### ЛЕГО РАДУГА


- безопасная альтернатива жевания карандашей, пальцев и т.д.
- способствует успокоению, концентрации внимания и саморегуляции



## Оральная/Вкусовая активность при расстройстве Сенсорной обработки



Бутылочки для дегустации Монтесори, четыре спектра четыре основных вкуса: соленый (соленые воды), сладкие (сахара или меда, воды), кислый (лимонный сок или разбавленный уксус) и горький (разводят миндаль, кофе или горьким шоколадом экстракт) этого фундаментального набора.



## Обонятельная активность при расстройстве сенсорной обработки



## Sensory Science Smell Bottles



Методы и приемы при  
планировании обработки  
аудиторной системы:

Навушники или беруши для  
защиты от фоновых шумов  
при выраженной  
фонофобии


Упрощение языка при даче  
инструкций классу

Лайте вперед  
предупреждение перед  
громкими звуками, такими  
как пожарные учения, чтобы  
закрывать уши

Терапевтические программы  
прослушивания,  
физ.минутки.



Слон



Массаж ушей




Дыхание  
животом



Энергетический зевок

## Слуховая деятельность при расстройстве сенсорной обработки



Метод 1 прием при нарушении обработки зрительной системы:

Уменьшите количество украшений на станке, чтобы ограничить отвлекающие факторы


Отрегулируйте освещение в классе (по возможности закройте люминесцентные лампы)

Используйте настольный мольберт

Копирование со страницы или книги с близкого расстояния вместо классной доски

Используйте цветные наклейки на страницах во время чтения


физ.минутки



Двойной рисунок





Ленивые восьмерки



Алфавитные восьмерки

# Зрительная деятельность при расстройстве сенсорной обработки





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**